

Total number of printed pages—19.

3 (Sem-6/CBCS) MAT RE 1/2

2024

MATHEMATICS

(Regular Elective)

Answer the Questions from any one Option.

OPTION-A

(*Numerical Analysis*)

Paper : MAT-RE-6016

Full Marks : 80

Time : Three hours

OPTION-B

(*Programming in C*)

Paper : MAT-RE-6026

Full Marks : 60

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Answer either in English or in Assamese.

Contd.

Total number of printed pages-19.

3 (Sem-6/CBCS) MAT RE 1/2

2024

MATHEMATICS

(Regular Elective)

Answer the Questions from any one Option.

OPTION-A

(*Numerical Analysis*)

Paper : MAT-RE-6016

Full Marks : 80

Time : Three hours

OPTION-B

(*Programming in C*)

Paper : MAT-RE-6026

Full Marks : 60

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Answer either in English or in Assamese.

Contd.

OPTION-A
(Numerical Analysis)

Paper : MAT-RE-6016

1. Answer the following questions : $1 \times 10 = 10$

তলত দিয়া প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Express the following system of equation in matrix form :

তলত উপরে কৰা সমীকৰণ প্রগালীটো মৌলকক্ষ আকাৰত
প্ৰকাশ কৰা :

$$2x + 3y - 5z = 6, \quad x - 3y + 4z = -5, \\ 5x - y + 11z = 7$$

(b) What is the 6th order difference of the 5th degree polynomial ?

5-তম মাত্রাৰ বহুপদ বাশিৰ 6-তম ক্ৰমৰ অন্তৰ কি হ'ব ?

(c) What is the degree of the interpolating polynomial passing through n -points ?

n টা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা অন্তৰেশন বহুপদ বাশিৰ ঘাট
কিমান ?

- (i) 2
- (ii) $\geq n$
- (iii) $\leq n$
- (iv) $< n$

(d) Evaluate $E^2 x^2$ when $h = 2$.
 $h = 2$ হ'লে $E^2 x^2$ নিৰ্ণয় কৰা।

(e) State True or False :
 শুন্দি নে অশুন্দি উপৰেখ কৰা :

"Simpson's $\frac{1}{3}$ -rule is applicable only
when n is a multiple of 3."

"চিম্পচনৰ $\frac{1}{3}$ বিধি প্ৰযোজ্য হ'ব যেতিয়া n একমাত্ৰ
3-ৰ গুণিতক হয়।"

(f) In the Gaussian elimination method,
the resulting co-efficient matrix for the
linear system of equations is
transformed into

Gaussian elimination বিধি ৰূপহাৰ কৰোতে
এটা বৈধিক গোটাৰ গুণাংক মৌলকক্ষ কোনটো ৰূপলৈ
কৰ্পাস্তৰ হয় ?

- (i) lower triangular matrix
নিম্ন ত্ৰিকোণীয় মৌলকক্ষ
- (ii) upper triangular matrix
উচ্চ ত্ৰিকোণীয় মৌলকক্ষ
- (iii) diagonal matrix
কৰ্ণ মৌলকক্ষ
- (iv) None of the above
ওপৰৰ এটাৰও নহয়

(Choose the correct option)
 (শুন্দি উত্তৰটো বাচি উলিওৱা)

OPTION-A

(Numerical Analysis)

Paper : MAT-RE-6016

1. Answer the following questions : $1 \times 10 = 10$

তলত দিয়া প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Express the following system of equation in matrix form :

তলত উল্লেখ কৰা সমীকৰণ প্রণালীটো মৌলিকক্ষ আকাৰত
প্ৰকাশ কৰা :

$$2x + 3y - 5z = 6, \quad x - 3y + 4z = -5, \\ 5x - y + 11z = 7$$

(b) What is the 6th order difference of the 5th degree polynomial ?

5-তম মাত্ৰাৰ বহুপদ বাশিৰ 6-তম ক্ৰমৰ অন্তৰ কি হ'ব ?

(c) What is the degree of the interpolating polynomial passing through n -points ?

n টা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা অন্তৰেশন বহুপদ বাশিৰ ঘাট
কিমান ?

- (i) 2
- (ii) $\geq n$
- (iii) $\leq n$
- (iv) $< n$

(d) Evaluate $E^2 x^2$ when $h = 2$.

$h = 2$ হ'লে $E^2 x^2$ নিৰ্ণয় কৰা।

(e) State True or False :

শুন্দি নে অঙ্কু উল্লেখ কৰা :

"Simpson's $\frac{1}{3}$ -rule is applicable only
when n is a multiple of 3."

"চিম্পচনৰ $\frac{1}{3}$ বিধি প্ৰযোজ্য হ'ব যেতিয়া n একমাত্ৰ
3-ৰ গুণিতক হয়।"

(f) In the Gaussian elimination method,
the resulting co-efficient matrix for the
linear system of equations is
transformed into

Gaussian elimination বিধি ব্যৱহাৰ কৰোতে
এটা বৈধিক গোটাৰ গুণাংক মৌলিকক্ষ কোনটো ৰূপলৈ
কৰাপন্ন হয় ?

- (i) lower triangular matrix
নিম্ন ত্ৰিকোণীয় মৌলিকক্ষ
- (ii) upper triangular matrix
উচ্চ ত্ৰিকোণীয় মৌলিকক্ষ
- (iii) diagonal matrix
কৰ্ণ মৌলিকক্ষ
- (iv) None of the above
ওপৰৰ এটাো নহয়

(Choose the correct option)

(শুন্দি উত্তৰটো বাচি উলিওৱা)

- (g) In trapezoidal rule, for the interval $(0, 1)$, if $h = 0.25$, then what is the value of n ?

$(0, 1)$ অন্তরালত ট্রেপিসহিড'ল সূত্রত $h = 0.25$ হ'লে n -ৰ মান কি?

- (h) Which of the following methods is not used for numerical integration?

তলৰ কোনটো বিধি সংখ্যাত্মক অনুকলনৰ বাবে ব্যবহাৰ নহয়?

- (i) Trapezoidal rule
- (ii) Simpson's rule
- (iii) Gauss iteration
- (iv) Romberg integration

(Choose the correct option)
(শুধু উত্তৰটো বাচি উলিওৱা)

- (i) Fill in the blanks (খালী ঠাই পূৰণ কৰা):

$$f(x) - f(x-h) = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (j) Write the Lagrange's interpolation formula passing through two points (x_0, f_0) and (x_1, f_1) .

(x_0, f_0) আৰু (x_1, f_1) বিন্দু দুটোৰ মাজেৰে যোৱা লাগ্ৰেঞ্জ অন্তৰেশন সূত্ৰটো লিখা।

2. Answer the following questions : $2 \times 5 = 10$

তলত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Construct the forward difference table for the following data :

তলত দিয়া তালিকাৰ পৰা ফৰৱাৰ্ড অন্তৰ টেবুল গঠন কৰা :

x	..	1	2	3	4
y	:	10	13	22	43

- (b) Prove that (প্ৰমাণ কৰা যে) :

$$E^{-1} = 1 - \nabla$$

- (c) Find the 3rd divided difference of $f(x) = x^3 - 2x$ with arguments 2, 4, 9, 10.

$f(x) = x^3 - 2x$ হ'লে, বাশিস্বচক 2, 4, 9, 10-ৰ কাৰণে তৃতীয় বিভাজিত অন্তৰ মান উলিওৱা।

- (d) Write a short note on numerical integration.

সংখ্যাত্মক অনুকলনৰ ওপৰত এটি চমু টোকা লিখা।

(g) In trapezoidal rule, for the interval $(0, 1)$, if $h = 0.25$, then what is the value of n ?

$(0, 1)$ অন্তরালত ট্রেপিসহিড'ল সূত্রত $h = 0.25$ হ'লে n -ৰ মান কি?

(h) Which of the following methods is not used for numerical integration?

তলৰ কোনটো বিধি সংখ্যাত্মক অনুকলনৰ বাবে ব্যবহাৰ নহয়?

(i) Trapezoidal rule

(ii) Simpson's rule

(iii) Gauss iteration

(iv) Romberg integration

(Choose the correct option)

(শুন্দি উত্তৰটো বাচি উলিওৱা)

(i) Fill in the blanks (খালী ঠাই পূৰণ কৰা):

$$f(x) - f(x-h) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(j) Write the Lagrange's interpolation formula passing through two points (x_0, f_0) and (x_1, f_1) .

(x_0, f_0) আৰু (x_1, f_1) বিন্দু দুটাৰ মাজেৰে যোৰা লাগ্ৰাঞ্জৰ অন্তৰ্শেন সূত্রটো লিখা।

2. Answer the following questions : $2 \times 5 = 10$

তলত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Construct the forward difference table for the following data :

তলত দিয়া তালিকাৰ পৰা ফৰৱাৰ্ড অন্তৰ টেবুল গঠন কৰা :

x	1	2	3	4
y	10	13	22	43

(b) Prove that (প্ৰমাণ কৰা যে) :

$$E^{-1} = 1 - \nabla$$

(c) Find the 3rd divided difference of $f(x) = x^3 - 2x$ with arguments 2, 4, 9, 10.

$f(x) = x^3 - 2x$ হ'লে, ৰাশিসূচক 2, 4, 9, 10-ৰ কাৰণে তৃতীয় বিভাজিত অন্তৰ মান উলিওৱা।

(d) Write a short note on numerical integration.

সংখ্যাত্মক অনুকলনৰ ওপৰত এটি চমু টোকা লিখা।

- (e) What are the two types of methods for finding numerical solutions to ODE?

ODE সমাধান কৰা দুইবিধি সংখ্যাত্মক পদ্ধতি কি?

3. Answer **any four** questions : $5 \times 4 = 20$

যিকোনো চারিটা প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Show that (দেখুওৱা যে) :

$$\Delta \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) \cdot \Delta f(x) - f(x) \cdot \Delta g(x)}{g(x) \cdot E(g(x))}$$

- (b) Use Gauss-Jordan method to solve :

Gauss-Jordan পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা :

$$2x - 3y - 5z = -5, x + 2z = 4,$$

$$3x + y - 3z = -4$$

- (c) Find the equation of the polynomial passing through the points $(4, -43)$, $(7, 83)$, $(9, 327)$ and $(12, 1053)$ using Newton's divided difference formula.

নিউটনৰ বিভাজিত অন্তৰৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি $(4, -43)$, $(7, 83)$, $(9, 327)$ আৰু $(12, 1053)$ বিন্দুকেইটাৰ মাজেৰে যোৱা বহুপদ বাশিটো উলিওৱা।

- (d) Given $\frac{dy}{dx} = x + y$ with $y = 0$ for $x = 0$.

Find the value of y at $x = 1$ taking $h = 0.2$.

দিয়া আছে, $\frac{dy}{dx} = x + y$, য'ত $y = 0$ যেতিয়া

$x = 0$. $h = 0.2$ লৈ y -ৰ মান উলিওৱা যেতিয়া $x = 1$.

- (e) Find $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ using Simpson's $\frac{1}{3}$ rule.

চিম্পচনৰ $\frac{1}{3}$ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ ৰ মান

উলিওৱা।

- (f) Consider the points $(x_0, y_0) = (1, 2)$,

$$(x_1, y_1) = (2, 4), (x_2, y_2) = (3, 8),$$

$$(x_3, y_3) = (4, 16), (x_4, y_4) = (5, 32).$$

Estimate $f'(x_2) = f'(3)$ using Newton's forward, backward and central difference formula.

- (e) What are the two types of methods for finding numerical solutions to ODE?

ODE সমাধান কৰা দুইবিধি সংখ্যাত্মক পদ্ধতি কি?

3. Answer **any four** questions : $5 \times 4 = 20$

যিকোনো চারিটা প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Show that (দেখুওৱা যে) :

$$\Delta \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) \cdot \Delta f(x) - f(x) \cdot \Delta g(x)}{g(x) \cdot E(g(x))}$$

- (b) Use Gauss-Jordan method to solve :

Gauss-Jordan পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা :

$$2x - 3y - 5z = -5, x + y + 2z = 4,$$

$$3x + y - 3z = -4$$

- (c) Find the equation of the polynomial passing through the points $(4, -43)$, $(7, 83)$, $(9, 327)$ and $(12, 1053)$ using Newton's divided difference formula.

নিউটনৰ বিভাজিত অন্তৰৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি $(4, -43)$, $(7, 83)$, $(9, 327)$ আৰু $(12, 1053)$ বিন্দুকেইটাৰ মাজেৰে যোৱা বহুপদ ৰাশিটো উলিওৱা।

- (d) Given $\frac{dy}{dx} = x + y$ with $y = 0$ for $x = 0$.

Find the value of y at $x = 1$ taking $h = 0.2$.

দিয়া আছে, $\frac{dy}{dx} = x + y$, য'ত $y = 0$ যেতিয়া $x = 0$.

$x = 0$, $h = 0.2$ লৈ y -ৰ মান উলিওৱা যেতিয়া $x = 1$.

- (e) Find $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ using Simpson's $\frac{1}{3}$ rule.

চিম্পচনৰ $\frac{1}{3}$ সুত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ ৰ মান

উলিওৱা।

- (f) Consider the points $(x_0, y_0) = (1, 2)$,

$$(x_1, y_1) = (2, 4), (x_2, y_2) = (3, 8),$$

$$(x_3, y_3) = (4, 16), (x_4, y_4) = (5, 32).$$

Estimate $f'(x_2) = f'(3)$ using Newton's forward, backward and central difference formula.

- $(x_0, y_0) = (1, 2)$, $(x_1, y_1) = (2, 4)$,
 $(x_2, y_2) = (3, 8)$, $(x_3, y_3) = (4, 16)$,
 $(x_4, y_4) = (5, 32)$. এই বিন্দুসমূহৰ পৰা

$f'(x_2) = f'(3)$ ৰ আনুমানিক মান অঞ্চলগামী,

পশ্চাত্তরতী আৰু কেন্দ্ৰীয় অন্তৰ সূত্ৰৰ সহায়ত উলিওৱা।

4. Answer **any four** questions : $10 \times 4 = 40$

যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Derive Newton-Gregory backward difference interpolation formula. Use it to obtain an interpolating polynomial from the following data : $5+5=10$

নিউটন-গ্ৰেগৰী পশ্চাত্গামী অন্তৰেশন সূত্ৰটো প্ৰাপ্ত কৰা।
 ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ তথ্যসমূহৰ পৰা অন্তৰেশন
 বহুপদ উলিওৱা :

x	: 0	2	4	6
$f(x)$: 8	11	20	41

(b) (i) Obtain the missing values of the table given below :

তলত দিয়া তালিকাখনৰ খালী ঠাই পূৰণ কৰা :

x :	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
y :	0.135	-	0.111	0.100	-	0.082	0.074

(ii) If $f(x)$ be a polynomial of degree n , then prove that

$$\Delta^n f(x) = \text{constant}$$

$$\text{and } \Delta^{n+1} f(x) = 0.$$

$$5+5=10$$

$f(x)$ এটা n -ঘাটৰ বহুপদ ৰাশি হ'লে প্ৰমাণ কৰা
 যে $\Delta^n f(x) =$ ধৰক আৰু $\Delta^{n+1} f(x) = 0$.

(c) Solve by Gauss-Seidel method correct to 4-decimal place :

গাউচ-চেয়দেল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা 4
 দশমিক শুন্ধ স্থানলৈ :

$$28x + 4y - z = 32$$

$$x + 3y + 10z = 24$$

$$2x + 17y + 4z = 35$$

$$(x_0, y_0) = (1, 2), \quad (x_1, y_1) = (2, 4),$$

$$(x_2, y_2) = (3, 8), \quad (x_3, y_3) = (4, 16),$$

$(x_4, y_4) = (5, 32)$. এই বিন্দুসমূহৰ পৰা

$f'(x_2) = f'(3)$ ৰ আনুমানিক মান অংগামী,

পশ্চাৎৰেতো আৰু কেন্দ্ৰীয় অন্তৰৰ সূত্ৰৰ সহায়ত উলিওৱা।

4. Answer **any four** questions : $10 \times 4 = 40$

যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Derive Newton-Gregory backward difference interpolation formula. Use it to obtain an interpolating polynomial from the following data : $5+5=10$

নিউটন-গ্ৰেগৰী পশ্চাৎগামী অন্তৰেশন সূত্ৰটো প্ৰাপ্ত কৰা।

ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ তথ্যসমূহৰ পৰা অন্তৰেশন

বহুপদ উলিওৱা :

x :	0	2	4	6
$f(x)$:	8	11	20	41

(b) (i) Obtain the missing values of the table given below :

তলত দিয়া তালিকাখনৰ খালী ঠাই পূৰণ কৰা :

$$x : 2.0 \quad 2.1 \quad 2.2 \quad 2.3 \quad 2.4 \quad 2.5 \quad 2.6$$

$$y : 0.135 \quad - \quad 0.111 \quad 0.100 \quad - \quad 0.082 \quad 0.074$$

(ii) If $f(x)$ be a polynomial of degree n , then prove that

$$\Delta^n f(x) = \text{constant}$$

$$\text{and } \Delta^{n+1} f(x) = 0.$$

$$5+5=10$$

$f(x)$ এটা n -ঘাটৰ বহুপদ বাণি হ'লে প্ৰমাণ কৰা

$$\text{যে } \Delta^n f(x) = \text{ধৰক আৰু } \Delta^{n+1} f(x) = 0.$$

(c) Solve by Gauss-Seidel method correct to 4-decimal place :

গাউচ-চেয়দেল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা 4
দশমিক শুন্দৰ স্থানলৈ :

$$28x + 4y - z = 32$$

$$x + 3y + 10z = 24$$

$$2x + 17y + 4z = 35$$

- (d) Evaluate $\int_2^{10} \frac{dx}{1+x}$ by using Simpson's rule and trapezoidal rule.

চিম্পচন আৰু ট্ৰেপিয়েডাল বিধি ব্যৱহাৰ কৰি $\int_2^{10} \frac{dx}{1+x}$

নিৰ্ণয় কৰা।

- (e) Apply modified Euler's method to evaluate y when $x=0.05$ and $x=0.10$

for $\frac{dy}{dx} = x+y; y(0)=1$.

$x=0.05$ আৰু $x=0.10$ -ত modified Euler বিধি প্ৰয়োগ কৰি $\frac{dy}{dx} = x+y; y(0)=1$ -ৰ বাবে

y -ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (f) Write a short note on midpoint method. Why is it superior to Euler's method ? Use midpoint method to solve

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 = 1.2y; y(0)=1,$$

for $0 \leq x \leq 2$.

$$2+2+6=10$$

Midpoint বিধিৰ ওপৰত এটা চমু টোকা লিখা।
ই Euler-ৰ বিধিতকৈ কিয় উন্নত? Midpoint পদ্ধতি
ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 = 1.2y; y(0)=1,
0 \leq x \leq 2 \text{-ৰ বাবে।}$$

- (g) (i) From the following table find the number of students who obtained marks less than 45 :

তলত উল্লেখ কৰা তালিকাৰ পৰা 45 নম্বৰৰ
তলত পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা :

Marks	: 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
নম্বৰ					
No. of students	: 31	42	51	35	31

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা

- (ii) A third degree polynomial passes through the points $(3, 3)$, $(2, 12)$, $(1, 15)$ and $(-1, -21)$. Find the polynomial.

5+5=10

এটা ত্ৰিমাত্ৰিক বহুপদ ৰাখি $(3, 3)$, $(2, 12)$,
 $(1, 15)$ আৰু $(-1, -21)$ বিন্দুকেইটাৰ মাজেৰে
যায়। বহুপদ ৰাখিটো নিৰ্ণয় কৰা।

- (d) Evaluate $\int_2^{10} \frac{dx}{1+x}$ by using Simpson's rule and trapezoidal rule.

চিম্পচন আৰু ট্ৰেপিয়েডাল বিধি ব্যৱহাৰ কৰি $\int_2^{10} \frac{dx}{1+x}$

নিৰ্ণয় কৰা।

- (e) Apply modified Euler's method to evaluate y when $x=0.05$ and $x=0.10$

for $\frac{dy}{dx} = x + y; y(0) = 1$.

$x=0.05$ আৰু $x=0.10$ ত modified Euler

বিধি প্ৰয়োগ কৰি $\frac{dy}{dx} = x + y; y(0) = 1$ -ৰ বাবে
 y -ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (f) Write a short note on midpoint method. Why is it superior to Euler's method ? Use midpoint method to solve

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 = 1 \cdot 2y; y(0) = 1,$$

for $0 \leq x \leq 2$.

$$2+2+6=10$$

Midpoint বিধিৰ ওপৰত এটা চমু টোকা লিখা।
ই Euler-ৰ বিধিতকৈ কিয় উন্নত? Midpoint পদ্ধতি
ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 = 1 \cdot 2y; y(0) = 1,$$

$0 \leq x \leq 2$ ৰ বাবে।

- (g) (i) From the following table find the number of students who obtained marks less than 45 :

তলত উপ্পেখ কৰা তালিকাৰ পৰা 45 নম্বৰৰ
তলত পোৱা ছত্ৰ-ছত্ৰীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা :

Marks	: 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
নম্বৰ					
No. of students	: 31	42	51	35	31
ছত্ৰ-ছত্ৰীৰ সংখ্যা					

- (ii) A third degree polynomial passes through the points $(3, 3)$, $(2, 12)$, $(1, 15)$ and $(-1, -21)$. Find the polynomial.

5+5=10

এটা ত্ৰিমাত্ৰিক বহুপদ ৰাশি $(3, 3)$, $(2, 12)$,
 $(1, 15)$ আৰু $(-1, -21)$ বিন্দুকেইটাৰ মাজেৰে
যায়। বহুপদ ৰাশিটো নিৰ্ণয় কৰা।

- (h) Obtain a general quadrature formula
 $\int_a^b f(x) dx$.

Hence deduce Simpson's $\frac{1}{3}$ rule.

$$5+5=10$$

$\int_a^b f(x) dx$ -ৰ বাবে সাধাৰণ বৰ্গ হিচাপত কলি
 (quadrature) সূত্ৰটো উলিওৱা।

ইয়াৰ পৰা চিম্পচনৰ $\frac{1}{3}$ সূত্ৰটো নিৰ্ণয় কৰা।

OPTION-B

(Programming in C)

Paper : MAT-RE-6026

1. Answer the following questions : $1 \times 7 = 7$

তলত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Define nibble and byte.

নিবল আৰু বাইট সংজ্ঞায়িত কৰক।

- (b) Convert the following into a C expression :

নিম্নলিখিতক এটা C অভিব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰক :

$$\frac{a+b}{c+d}$$

- (c) Write one relational operator in C language.

C ভাষাত এটা সম্পর্কীয় অপাৰেটৰ লিখা।

- (d) What is the purpose of a comma operator in C ?

C-ত কমা অপাৰেটৰৰ উদ্দেশ্য কি?

- (h) Obtain a general quadrature formula
for $\int_a^b f(x) dx$.

Hence deduce Simpson's $\frac{1}{3}$ rule.

$$5+5=10$$

$\int_a^b f(x) dx$ -র বাবে সাধারণ বর্গ হিচাপত কালি
(quadrature) সূত্রটো উলিওৱা।

ইয়াৰ পৰা চিম্পচনৰ $\frac{1}{3}$ সূত্রটো নিৰ্ণয় কৰা।

OPTION-B

(Programming in C)

Paper : MAT-RE-6026

1. Answer the following questions : $1 \times 7 = 7$

তলত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Define nibble and byte.

নিবল আৰু বাইট সংজ্ঞায়িত কৰক।

- (b) Convert the following into a C expression :

নিম্নলিখিতক এটা C অভিব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰক :

$$\frac{a+b}{c+d}$$

- (c) Write one relational operator in C language.

C ভাষাত এটা সম্পৰ্কীয় অপাৰেটৰ লিখা।

- (d) What is the purpose of a comma operator in C?

C-ত কমা অপাৰেটৰৰ উদ্দেশ্য কি?

- (e) Determine the value of the following logical expression for $a = 5$, $b = 10$, $c = -6$:

$a = 5$, $b = 10$, $c = -6$ -ৰ বাবে নিম্নলিখিত যুক্তিসংগত অভিব্যক্তিৰ মান নির্ধারণ কৰা :

$$b > c \& \& c < 0 \quad || \quad a > 0$$

- (f) What is the use of "\n"?

"\n"-ৰ কি কাম?

- (g) What is the significance of %c?

%c-ৰ তাৎপর্য কি?

2. Answer the following questions : $2 \times 4 = 8$

তলত দিয়া প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Write a C program to find the sum of three given numbers.

তিনিটা প্রদত্ত সংখ্যাৰ যোগফল বিচাৰিবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (b) What are library functions? Mention any four library functions.

লাইব্ৰেৰী ফাংচনৰোৰ কি? যিকোনো চাৰিটা লাইব্ৰেৰী ফাংচন উল্লেখ কৰক।

- (c) Explain with examples the syntax of scanf() and printf().

scanf() আৰু printf()-ৰ বাক্যবিন্যাস উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰক।

- (d) What is the output for the following program?

তলৰ ফাংচনটোৰ আউটপুত কিমান?

main()

{

 int x=5;

 while (x==1)

 x=x-1;

 printf("%d\n",x);

}

- (e) Determine the value of the following logical expression for $a = 5$, $b = 10$, $c = -6$:

$a = 5$, $b = 10$, $c = -6$ -ৰ বাবে নিম্নলিখিত যুক্তিসংগত অভিযন্তিৰ মান নির্ধারণ কৰা :

$$b > c \& \& c < 0 \quad | \quad a > 0$$

- (f) What is the use of "\n"?

"\n"-ৰ কি কাম?

- (g) What is the significance of %c?

%c ৰ তাৎপর্য কি?

- Answer the following questions : $2 \times 4 = 8$

তলত দিয়া প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Write a C program to find the sum of three given numbers.

তিনিটা প্রদত্ত সংখ্যাৰ যোগফল বিচাৰিবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (b) What are library functions? Mention any four library functions.

লাইব্ৰেৰী ফাংচনৰোৰ কি? যিকোনো চাৰিটা লাইব্ৰেৰী ফাংচন উল্লেখ কৰক।

- (c) Explain with examples the syntax of scanf() and printf().

scanf() আৰু printf() -ৰ বাক্যবিন্যাস উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰক।

- (d) What is the output for the following program?

তলৰ ফাংচনটোৰ আউটপুত কিমান?

main()

{

 int x=5;

 while (x==1)

 x=x-1;

 printf("%d\n",x);

}

3. Answer **any three** questions : $5 \times 3 = 15$

যিকোনো তিনিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া :

- (a) Write a C program to generate and print numbers between 100 and 200 that are divisible by 2 but not by 3.

100 আৰু 200-ৰ মাজৰ সংখ্যা সৃষ্টি আৰু প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ
এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখক যিবোৰ 2-ৰে হৰণযোগ্য কিন্তু
3-ৰে হৰণ নহয়।

- (b) Write a C program to display the ASCII value of a given character.

এটা প্ৰদত্ত আখৰৰ ASCII মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এটা C
প্ৰগ্ৰাম লিখক।

- (c) Write a C program to find the biggest of given two numbers.

প্ৰদত্ত দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো
বিচাৰি উলিয়াবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (d) Write a C program to find the factorial of a given integer k .

এটা প্ৰদত্ত পূৰ্ণসংখ্যা k -ৰ ফ্যাক্টৱিয়েল বিচাৰিবলৈ এটা
C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (e) Write a C program to compute the value of π from the following series :

তলৰ শৃংখলাৰ পৰা π -ৰ মান গণনা কৰিবলৈ এটা C
প্ৰগ্ৰাম লিখা :

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

4. Answer **any three** questions : $10 \times 3 = 30$

যিকোনো তিনিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া :

- (a) Write a C program to find the arithmetic mean and variance of any n values.

যিকোনো n মানৰ গাণিতিক গড় আৰু variance
বিচাৰিবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (b) Write a C program to find the trace of a given square matrix of order $m \times m$.

$m \times m$ ক্ৰমৰ এটা প্ৰদত্ত বৰ্গ মেট্ৰিক্সৰ ট্ৰেচ বিচাৰিবলৈ
এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

3. Answer **any three** questions : $5 \times 3 = 15$

যিকোনো তিনিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া :

- (a) Write a C program to generate and print numbers between 100 and 200 that are divisible by 2 but not by 3.

100 আৰু 200-ৰ মাজৰ সংখ্যা সৃষ্টি আৰু প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ
এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখক যিবোৰ 2-ৰে হৰণযোগ্য কিন্তু
3-ৰে হৰণ নহয়।

- (b) Write a C program to display the ASCII value of a given character.

এটা প্ৰদত্ত আখৰৰ ASCII মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এটা C
প্ৰগ্ৰাম লিখক।

- (c) Write a C program to find the biggest of given two numbers.

প্ৰদত্ত দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো
বিচাৰি উলিয়াবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (d) Write a C program to find the factorial of a given integer k .

এটা প্ৰদত্ত পূৰ্ণসংখ্যা k -ৰ ফ্যাক্টৱিয়েল বিচাৰিবলৈ এটা C
প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (e) Write a C program to compute the value of π from the following series :

তলৰ শৃংখলাৰ পৰা π -ৰ মান গণনা কৰিবলৈ এটা C
প্ৰগ্ৰাম লিখা :

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

4. Answer **any three** questions : $10 \times 3 = 30$

যিকোনো তিনিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া :

- (a) Write a C program to find the arithmetic mean and variance of any n values.

যিকোনো n মানৰ গাণিতিক গড় আৰু variance
বিচাৰিবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (b) Write a C program to find the trace of a given square matrix of order $m \times m$.

$m \times m$ ক্ৰমৰ এটা প্ৰদত্ত বৰ্গ মেট্ৰিক্সৰ ট্ৰেচ বিচাৰিবলৈ
এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (c) Write a C program to count the number of vowels present in a sentence.

বাক্য এটাত থকা স্বরবর্ণৰ সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (d) Write a program in C to read a matrix of order $m \times n$ and print the sum of all elements using functions.

$m \times n$ ক্ৰমৰ মেট্ৰিক্স পঢ়িবলৈ আৰু ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি সকলো উপাদানৰ যোগফল প্ৰিন্ট কৰিবলৈ C-ত এটা প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (e) Write a C program to sort a set of n numbers in ascending order and explain the algorithm used.

n টা সংখ্যাৰ এটা গোটক আৰোহী ক্ৰমত সজাবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা আৰু ব্যৱহৃত algorithm ব্যাখ্যা কৰা।

- (f) Write a C program to convert a decimal number into its equivalent binary number.

এটা দশমিক সংখ্যাক ইয়াৰ সমতুল্য বাইনারী সংখ্যালৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (c) Write a C program to count the number of vowels present in a sentence.

বাক্য এটাত থকা স্বরবর্ণৰ সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (d) Write a program in C to read a matrix of order $m \times n$ and print the sum of all elements using functions.

$m \times n$ ক্ৰমৰ মেট্ৰিক্স পড়িবলৈ আৰু ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি সকলো উপাদানৰ যোগফল প্ৰিন্ট কৰিবলৈ C-ত এটা প্ৰগ্ৰাম লিখা।

- (e) Write a C program to sort a set of n numbers in ascending order and explain the algorithm used.

n টা সংখ্যাৰ এটা গোটক আৰোই ক্ৰমত সজাবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা আৰু ব্যৱহৃত algorithm ব্যাখ্যা কৰা।

- (f) Write a C program to convert a decimal number into its equivalent binary number.

এটা দশমিক সংখ্যাক ইয়াৰ সমতুল্য বাইনাৰী সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ এটা C প্ৰগ্ৰাম লিখা।