

Total number of pages – 32



CODE : 35T MATH
(EN/AS/BN/BD)

2025

MATHEMATICS

Full Marks : 100

Pass Marks : 30

Time : Three hours

***The figures in the margin indicate full marks
for the questions.***

Q. No. **1** (a-l) carries **1** mark each (any ten) $1 \times 10 = 10$

Q. Nos. **2-13** carry **4** marks each..... $4 \times 12 = 48$

Q. Nos. **14-20** carry **6** marks each..... $6 \times 7 = 42$

Total = 100

1. Answer the following questions : (any ten) 1×10=10

তলৰ প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া : (যিকোনো দহটা)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে-কোনো দশটি)

गाहायनि सोनायफोरनि फिननाय हो : (जायखिजाया मोनजि)

- (a) Find the number of all one-one functions from set $A = \{1, 2, 3\}$ to $B = \{a, b, c\}$.

সংহতি $A = \{1, 2, 3\}$ ব পৰা $B = \{a, b, c\}$ লৈ মুঠ কিমানটা একৈকী ফলন আছে?

সংহতি $A = \{1, 2, 3\}$ -এৰ মध्ये $B = \{a, b, c\}$ -তে মোট কতগুলি একৈকী অপেক্ষক আছে।

थुबुर $A = \{1, 2, 3\}$ निफ्राय $B = \{a, b, c\}$ सिम गासै बेसेबां गुदिफा मावथुन दं ?

- (b) Find the principal value of $\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$.

$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ ব মুখ্য মান নির্ণয় কৰা।

$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ -এৰ মুখ্য মান নির্ণয় কৰো।

$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ নি गाहाइ मान दिहुन।

- (c) Let A , B and C are matrices of order $2 \times n$, 3×2 and $2 \times k$ respectively. Then $AB + CB$ will be defined for what values of n and k ?

ধৰাহৈল A , B আৰু C যথাক্রমে $2 \times n$, 3×2 আৰু $2 \times k$ ঘাতৰ মৌলকক্ষ। তেন্তে $AB + CB$ মৌলকক্ষটো n আৰু k ৰ কি মানৰ কাৰণে সংজ্ঞাবদ্ধ হ'ব?

ধৰা হল A , B এবং C যথাক্রমে $2 \times n$, 3×2 এবং $2 \times k$ ঘাতের মৌলকক্ষ। তাহলে $AB + CB$ মৌলকক্ষটি n এবং k -এর কোন মানের জন্য সংজ্ঞাবদ্ধ হবে ?

हमबाय A , B आरु C फारियै $2 \times n$, 3×2 आरु $2 \times k$ फारिनि थोंसाजाय। अब्ला $AB + CB$ थोंसाजाया n आरु k नि मा माननि थाखाय बुंफोरथियारि जागोन ?

- (d) State True or False :

Let R be the relation in the set $\{1, 2, 3, 4\}$, given by

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}.$$

Then R is reflexive but not symmetric.

শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা :

$\{1, 2, 3, 4\}$ সংহতিত সংজ্ঞাবদ্ধ সম্বন্ধ R এনেদৰে দিয়া আছে,

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}.$$

তেন্তে R প্রতিফলনীয়, কিন্তু প্রতিসম নহয়।

শুদ্ধ না অশুদ্ধ লেখো :

$\{1, 2, 3, 4\}$ সংহতিতে সংজ্ঞাবদ্ধ সম্বন্ধ R এমনভাবে দেওয়া আছে যে —

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}.$$

তাহলে R প্রতিফলনীয়, কিন্তু প্রতিসম নয়।

থার এন্ডা নংখায় লিখ :

$\{1, 2, 3, 4\}$ থুবুরআব বুংফোরথিয়ারি সোমোন্দো R এরৈবাতি হোনায দং,

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}$$

অব্লা R আ রিফিখাং, নাথায় ফারিগ্ৰোব নডা।

(e) Differentiate e^{x^2+1} with respect to x .

e^{x^2+1} ব x সাপেক্ষে অবকলজ উলিওরা।

e^{x^2+1} -এর x সাপেক্ষে অবকলজ নির্ণয় করো।

e^{x^2+1} নি x লোব্বায়াব সানখি দিহুন।

$$(f) \int e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = ?$$

(g) Determine the order of the differential equation

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x.$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x \text{ অবকল সমীকরণের ক্রম নির্ণয় কবা।}$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x \text{ অবকল সমীকরণের ক্রম নির্ণয় করো।}$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x \text{ সানখি সমানথাইনি ফারি দিহুন।}$$

(h) For what values of θ , $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$, where θ be the angle between the vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$?

θ ব কি মানব কাবণে $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ হয়, যত θ হৈছে ভেক্টর $\vec{a}$ আক $\vec{b}$ ব মাজব কোণ?

θ -এর কোন্ মানের জন্য $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ হয়, যেখানে θ হল ভেক্টর $\vec{a}$ এবং $\vec{b}$ -এর মধ্যবর্তী কোণ?

θ নি মা মাননি থাখায়নো $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ জায়ো, জেরাব θ আ জাদোঁ ভেক্টর $\vec{a}$ আরো $\vec{b}$ নি গেজেরনি খনা?

(i) A homogeneous differential equation of the form $\frac{dx}{dy} = h \left(\frac{x}{y} \right)$

can be solved by making the substitution—

$$(A) \quad y = vx$$

$$(B) \quad v = yx$$

$$(C) \quad x = vy$$

$$(D) \quad x = v$$

$\frac{dx}{dy} = h\left(\frac{x}{y}\right)$ আকারৰ সমমাত্ৰিক অৱকল সমীকৰণ সমাধানৰ বাবে প্রতিষ্ঠাপন সূত্রটো

হ'ল—

(A) $y = vx$

(B) $v = yx$

(C) $x = vy$

(D) $x = v$

$\frac{dx}{dy} = h\left(\frac{x}{y}\right)$ আকাৰৰ সমমাত্ৰিক অৱকল সমীকৰণ সমাধানৰ জন্য প্রতিস্থাপন সূত্রটি

হ'ল—

(A) $y = vx$

(B) $v = yx$

(C) $x = vy$

(D) $x = v$

$\frac{dx}{dy} = h\left(\frac{x}{y}\right)$ মাহৰনি ফোলেৱলি সানখি সমানথাই। মাবফুংথাইনি থাখায় ফজ'স্লায়নায

মাবসুলুআ জাৰায় —

(A) $y = vx$

(B) $v = yx$

(C) $x = vy$

(D) $x = v$

(j) Find the determinant of the matrix $A = [-3]_{1 \times 1}$.

$A = [-3]_{1 \times 1}$ মৌলকক্ষৰ নিৰ্ণায়ক উলিওৱা।

$A = [-3]_{1 \times 1}$ মৌলকক্ষৰ নিৰ্ণায়ক বের কৰো।

$A = [-3]_{1 \times 1}$ থোঁসাজায়নি দিহুনলি দিহুন।

(k) State True or False :

$\sin x + 100$ is an antiderivative of $\cos x$.

শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা :

$\sin x + 100$ টো $\cos x$ ৰ এটা প্রতি-অৱকলজ।

শুদ্ধ না অশুদ্ধ লেখো :

$\sin x + 100$ হল $\cos x$ -এৰ একটি অ্যান্টি-ডেৰিভেটিভ।

থার **एवा** नंखाय लिर :

$\sin x + 100$ आ $\cos x$ नि मोनसे सोलायखि उत्था।

(l) Find the direction ratios of the line segment joining the points $(-2, 4, -5)$ and $(1, 2, 3)$.

$(-2, 4, -5)$ আৰু $(1, 2, 3)$ বিন্দু সংযোগী ৰেখাডালৰ দিশানুপাত উলিওৱা।

$(-2, 4, -5)$ এবং $(1, 2, 3)$ বিন্দু-সংযোগকাৰী ৰেখাটিৰ দিশানুপাত নিৰ্ণয় কৰো।

$(-2, 4, -5)$ আরো $(1, 2, 3)$ বিন্দো ফোনাঁজাৰনায হাংখোনি হজুজখা থিংজায় দিহুন।

2. Find the simplest form of the function

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0$$

4

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0 \text{ ফলনটো সৰলতম আকাৰত প্ৰকাশ কৰা।}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0 \text{ অপেক্ষকটিকে সৰলতম আকাৰে প্ৰকাশ কৰো।}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0 \text{ মাবথুনখৌ গোরলৈসিন মহাৰাৱ ফোৰমাৰ।}$$

OR / নাইবা / অথবা / এৰা

$$\text{Find the value of } \tan^{-1}\left(2\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right).$$

4

$$\tan^{-1}\left(2\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right) \text{ ৰ মান উলিওৱা।}$$

$$\tan^{-1}\left(2\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right) \text{ -এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।}$$

$$\tan^{-1}\left(2\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right) \text{ নি মান দিহুন।}$$

3. Answer (i) and (ii) **or** (a) and (b):

উত্তৰ কৰা (i) আৰু (ii) অথবা (a) আৰু (b):

উত্তৰ দাও (i) এবং (ii) অথবা (a) এবং (b):

ফিননায লিৰ (i) আরো (ii) এৰা (a) আরো (b):

$$(i) \text{ If } A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ find } A^2.$$

1

$$\text{যদি } A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ উলিওৱা } A^2.$$

$$\text{যদি } A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ হয়, তাহলে } A^2 \text{-এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।}$$

$$\text{জুদি } A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ দিহুন } A^2.$$

$$(ii) \text{ If } A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ and } B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ where } A' \text{ is the transpose of } A, \text{ then find } (A+3B)'. \quad 3$$

$$\text{যদি } A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ আৰু } B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ য'ত } A' \text{ টো } A \text{ ৰ পক্ষান্তৰিত মৌলকক্ষ, তেন্তে } (A+3B)' \text{ উলিওৱা।}$$

$$\text{যদি } A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ এবং } B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ যেখানে } A' \text{ টি } A \text{-এৰ পক্ষান্তৰিত মৌলকক্ষ, তাহলে } (A+3B)' \text{ নিৰ্ণয় কৰো।}$$

$$\text{জুদি } A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ আরো } B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ জেৰাৱ } A' \text{ আ } A \text{ নি দৌনস্তাৰ্যথাই থোঁসাজায়, अब्ला } (A+3B)' \text{ दिहून।}$$

(a) Give an example of a skew-symmetric matrix. 1

বিষম-সমমিত মৌলকক্ষ এটাৰ উদাহৰণ দিয়া।

একটি বিষম-সমমিত মৌলকক্ষৰ উদাহৰণ দাও।

খুঁসলায় ফাৰিগোৰ থোঁসাজায় মোনসেনি বিদিন্থি হো।

(b) If $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ and $A + A' = I$, where I is the identity matrix of order 2, then find the value of x . 3

যদি $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ আৰু $A + A' = I$, য'ত I হৈছে 2 ঘাতৰ অভেদ মৌলকক্ষ, তেন্তে x -ৰ মান উলিওৱা।

যদি $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ এবং $A + A' = I$, যেখানে I হল 2 ঘাতের অভেদ মৌলকক্ষ, তাহলে x -র মান নির্ণয় কৰো।

জুদি $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ আরো $A + A' = I$, জেরাব I আ জাদোঁ 2 ফাৰিনি থাবিথা থোঁসাজায়, অল্লা x -নি মান দিহুন।

4. (i) Using determinants find the equation of the line joining the points (1, 2) and (3, 6). 2

নিৰ্ণায়ক ব্যবহার কৰি (1, 2) আৰু (3, 6) বিন্দু সংযোগী রেখাৰ সমীকৰণ উলিওৱা।

নিৰ্ণায়ক ব্যবহার করে (1, 2) এবং (3, 6) বিন্দু-সংযোগকারী রেখার সমীকরণ নির্ণয় কৰো।

দিহুনলি বাহাযনানৈ (1, 2) আরো (3, 6) বিন্দো ফোনাঁজাব হাংখোনি সমানথাই দিহুন।

(ii) Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = \sin x$ and $g(x) = x^2$. Then find composition function $g \circ f$. 2

(here $\mathbb{R}$ = set of real numbers)

যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যাতে $f(x) = \sin x$ আৰু $g(x) = x^2$, তেন্তে সংযোজন ফলন $g \circ f$ উলিওৱা। (ইয়াত $\mathbb{R}$ = বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংহতি)

যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এমন যে $f(x) = \sin x$ এবং $g(x) = x^2$, তাহলে সংযোজন অপেক্ষক $g \circ f$ নির্ণয় কৰো। (এখানে $\mathbb{R}$ = বাস্তৱ সংখ্যার সংহতি)

জুদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ জাহাথে $f(x) = \sin x$ আরো $g(x) = x^2$, অল্লা জথায় মাৱথুন $g \circ f$ দিহুন। (বেয়াব $\mathbb{R}$ = নংগুৰৈ অনজিমানি থুবুৰ)

5. Find $\frac{dy}{dx}$, if 2+2=4

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

$\frac{dy}{dx}$ উলিওৱা, যদি

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

$\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কৰো, যদি

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

$\frac{dy}{dx}$ দিহুন, জুদি

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

6. Find the intervals in which the function f given by
 $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ is

(a) increasing (b) decreasing 2+2=4

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ ব দ্বারা নির্দিষ্ট f ফলনটো কোন অন্তৰালত

(a) বৰ্ধমান

(b) হ্রাসমান উলিওৱা।

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ দ্বারা নির্দিষ্ট f অপেক্ষকটি কোন অন্তৰালে

(a) বৰ্ধমান এবং

(b) হ্রাসমান নির্ণয় কৰো।

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ নি জোহৈ থিখানায় f মাৰথুনা মাৰে খোন্দোৰাব

(a) বাঁলাঁমান

(b) খুমাৰলাঁমান দিহুন।

OR / নাইবা / অথবা / এৰা

A balloon, which always remains spherical, has a variable diameter $(2x+1)$. Find the rate of change of its volume with respect to x . 4

এটা বেলুন সদায় গোলাকাৰ হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পৰিবৰ্তনশীল ব্যাস $(2x+1)$ । x সাপেক্ষে ইয়াৰ আয়তনৰ পৰিবৰ্তনৰ হাৰ উলিওৱা।

একটি বেলুন সৰ্বদা গোলাকাৰ হয়ে থাকে এবং এর পৰিবৰ্তনশীল ব্যাস $(2x+1)$ । x -এৰ সাপেক্ষে এর আয়তনৰ পৰিবৰ্তনৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰো।

থোৰসে বেলুনা জেব্বাৰো দুলুৱ মহৰ জানানৈ থায়ো আরো বেনি সোলায়স্তু খাৱা $(2x+1)$ । x নি লোব্বায়াব বেনি ৰোজাগাসৈনি সোলায়নাযনি হাৰ দিহুন।

7. Evaluate : (any two) 2+2=4

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

মান নিৰ্ণয় কৰা : (যিকোনো দুটা)

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

মান নিৰ্ণয় কৰো : (যে-কোনো দুটি)

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

মান দিহন : (जायखिजाया मोननै)

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

OR / नहिवा / अथवा / एबा

Evaluate :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

मान निर्णय कबा :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

मान निर्णय करौ :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

मान दिहनु :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

4

8. Find the area lying in the first quadrant and bounded by the circle $x^2 + y^2 = 1$ and the lines $x = 0$ and $x = 1$. 4

প্রথম চোকত বৃত্ত $x^2 + y^2 = 1$ আৰু সবলৰেখা $x = 0$ আৰু $x = 1$ য়ে আগুৰা ক্ষেত্ৰৰ কালি উলিওৱা।

প্রথম চতুৰ্থাংশ বৃত্ত $x^2 + y^2 = 1$ এবং সরলরেখা $x = 0$ এবং $x = 1$ দ্বারা পরিবেষ্টিত ক্ষেত্ৰৰ কালি নির্ণয় কৰো।

গিৰি জম্মাৰসৈয়াব বঁচন $x^2 + y^2 = 1$ আরো गोथोंहांखो $x = 0$ আরো $x = 1$ আ आवगिनाय दब्लाइनि दब्लाइथि दिहनु।

OR / नहिवा / अथवा / एबा

- Find the area of the region bounded by the line $y = 3x + 2$, the x -axis and ordinate $x = 1$. 4

$y = 3x + 2$ সবলৰেখা, x -অক্ষ আৰু $x = 1$ কোটিয়ে আগুৰা ক্ষেত্ৰৰ কালি উলিওৱা।

$y = 3x + 2$ সরলরেখা, x -অক্ষ এবং $x = 1$ কোটি দ্বারা পরিবেষ্টিত ক্ষেত্ৰৰ কালি নির্ণয় কৰো।

$y = 3x + 2$ गोथोंहांखो, x -बिथ' আরो $x = 1$ जानस'आ आवगिनाय दब्लाइनि दब्लाइथि दिहनु।

9. (i) Let $\vec{a}$ is a non-zero vector of magnitude 2 and λ is a non-zero scalar. Find the value of λ such that $\lambda\vec{a}$ is a unit vector. 2

$\vec{a}$ এটা 2 মানৰ অশূন্য ভেক্টৰ আৰু λ এটা অশূন্য স্কেলাৰ। λ ৰ কি মানৰ বাবে $\lambda\vec{a}$ এটা একক ভেক্টৰ হ'ব?

$\vec{a}$ একটি 2 মানের অশূন্য ভেক্টর এবং λ একটি অশূন্য স্কেলার। λ -এর কোন মানের জন্য $\lambda\vec{a}$ একটি একক ভেক্টর হবে?

$\vec{a}$ আ मोनसे 2 माननि लाथिख' नडि भेक्टर आरु λ आ मोनसे लाथिख' नडि स्केलार। λ नि मा माननि थाखाय $\lambda\vec{a}$ आ मोनसे सांनगुदि भेक्टर जागोन ?

(iii) Find the direction cosine of the vector $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$. 2

$\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ ভেক্টৰৰ দিশাংক উলিওৱা।

$\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ ভেক্টৰৰ দিশাংক নিৰ্ণয় কৰো।

$\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ ভেক্টৰনি থোঁ কসাइन দিহুন।

10. If $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ are unit vectors such that $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, find the value of $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$. 4

যদি $\vec{a}$, $\vec{b}$ আৰু $\vec{c}$ একক ভেক্টৰ হয় যাতে $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, তেন্তে $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

যদি $\vec{a}$, $\vec{b}$ এবং $\vec{c}$ একক ভেক্টৰ হয় যাতে $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, তাহলে $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ -এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।

জুদি $\vec{a}$, $\vec{b}$ আৰু $\vec{c}$ সানগুদি ভেক্টৰ জায়ো জাহাথে $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, অল্লা $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ নি মান দিহুন।

OR / নাইবা / অথবা / এনা

Find the area of a triangle having the points $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ and $C(2, 3, 1)$ as its vertices. 4

এটা ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু তিনিটা $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ আৰু $C(2, 3, 1)$ হ'লে, ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিওৱা।

একটি ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু তিনিটি $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ এবং $C(2, 3, 1)$ হলে, ত্ৰিভুজটিৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো।

মোনসে আখান্থিথামনি থিখিনি বিন্দো মোনথামা $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ আৰু $C(2, 3, 1)$ জায়োল্লা আখান্থিথামনি দল্লাইথি দিহুন।

11. (i) Find a vector of magnitude 5 units in the direction of the vector $\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$. 2

$\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টৰৰ দিশত এনে এটা ভেক্টৰ উলিওৱা যাৰ মান 5 একক।

$\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টৰৰ দিশায় এমন একটি ভেক্টৰ নিৰ্ণয় কৰো যাৰ মান 5 একক।

$\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টৰনি দিগাব ঐৰুদি মোনসে ভেক্টৰ দিহুন জায়নি মানা 5 সানগুদি।

(ii) Find the projection of the vector $\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k}$ on the vector $7\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}$. 2

$7\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}$ ভেক্টৰত $\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k}$ ভেক্টৰৰ অভিক্ষেপ নিৰ্ণয় কৰা।

$7\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}$ ভেক্টৰৰ উপৰে $\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k}$ ভেক্টৰৰ অভিক্ষেপ বের কৰো।

$7\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}$ ভেক্টৰত $\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k}$ ভেক্টৰনি থোঁখানায় দিহুন।

12. (i) A coin is tossed three times. Find the probability of occurring head on the third toss. 2

একটা মুদ্রা তিনিবাৰ টছ কৰা হ'ল। তৃতীয় টছত মুণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিওৱা।

একটি মুদ্রা তিনবাৰ টস্ কৰা হল। তৃতীয় টসটিতে মুণ্ড হওয়ার সম্ভাব্যতা নিৰ্ণয় কৰো।

গাৰসে খাউরি থামখেৰ গাৰহৰনায় জাবায়। থামথি খেৰ গাৰহৰনায়াব খৰ' মোননায়নি জাথাবনা দিহুন।

- (ii) Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are spade. 2

52 পতীয়া তাকখেলাৰ থাক এটিৰ পৰা পুনৰ্স্থাপন নকৰাকৈ (without replacement) দুখন পাত যাদৃচ্ছিকভাৱে টনা হ'ল। দুয়োখন পাত ইস্কাপন (spade) হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

52 টি কাৰ্ড সমেত একাটি তাসেৰ প্যাকেট থেকে কোনোৱকম বদল না কৰে দুটি কাৰ্ড এলোমেলোভাৱে টনা হ'ল। উভয় কাৰ্ডেৰ স্পেড (ইস্কাপন) হওয়াৰ সম্ভাৱ্যতা নিৰ্ণয় কৰো।

গা 52 বিলাই থানায় জাবসে তাস বিলাইনিফ্রায় জেবো সোলায়া লাসিনো গানৈ বিলাই সাযজ্জল 'জানায় বাদিয়ে বোনায জাবায়। গানৈবো বিলাইয়া ইস্কাপন জানায়নি জাথাবনা দিহন।

13. A man is known to speak truth 4 out of 5 times. He throws a die and reports that it is three. Find the probability that it is actually three. 4

এজন মানুহে 5 বাৰৰ ভিতৰত 4 বাৰ সঁচা কথা কয় বুলি জনা যায়। তেওঁ পাশতি এটা টছ কৰে আৰু তিনি পোৱা বুলি ব্যক্ত কৰে। পাশতিটোত সচাকৈয়ে তিনি পোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

একজন মানুহ 5 বাৰেৰ মध्ये 4 বাৰ সত্য কথা বলে বলে জানা যায়। তিনি একাটি পাশা টস কৰেন এবং 'তিন' পেয়েছেন বলে জানান। পাশাটিতে সত্যি কৰে 'তিন' পাওয়ার সম্ভাৱ্যতা নিৰ্ণয় কৰো।

সাসে মানসিয়া 5 খেবনি মাदाव 4 खेब सैथो बाथा बुडो होनना मिथियो। बियो डाइस गरसे टस खालामो आरो थाम मोनबाय होनना फोरमायो। डाइसआव थारैनो थाम मोननायनि जाथावना दिहन।

OR / নাইবা / অথবা / এবা

A fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event 'head appears on the coin' and B be the event '3 on the die'. Check whether A and B are independent events or not. 4

এটা নিখুঁত মুদ্ৰা আৰু এটা অবিকৃত পাশতি একেলগে টছ কৰা হ'ল। 'মুদ্ৰাটোত মুণ্ড পোৱা ঘটনা'ক A আৰু 'পাশতিটোত 3 পোৱা ঘটনা'ক Bৰে সূচালে, A আৰু B স্বতন্ত্ৰ হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা।

একটা নিখুঁত মুদ্ৰা এবং একটি অবিকৃত পাশা একসঙ্গে টস্ কৰা হ'লো। 'মুদ্ৰাটিতে মুণ্ড পাওয়া ঘটনা'-কে A এবং 'পাশাটিতে 3 পাওয়ার ঘটনা'-কে B সূচিত কৰে। A এবং B স্বতন্ত্ৰ কিনা পৰীক্ষা কৰো।

गरसे स्लिमस्लिम खाउरि आरो गरसे रावनिबो फारसे जायि डाइस जयै गारहरनाय जाबाय। 'खाउरियाव खर' मोननाय जाथाइखौ A आरो 'डाइसआव 3 मोननाय जाथाइ'खौ B जों दिन्थियोब्ला। A आरो B आ उदां जाथाइ जायो ना जाया आनजाद खालाम।

14. Answer (a) or (b) :

উত্তৰ কৰা (a) আৰু (b) :

উত্তৰ দাও (a) অথবা (b) :

ফিননায লিৰ (a) এবা (b) :

- (a) (i) Find the minor and cofactor of the second row and second column element of the determinant 2

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

নিৰ্ণায়কৰ দ্বিতীয় শাৰী আৰু দ্বিতীয় স্তম্ভ মৌলটোৰ অনুৰাশি

আৰু সহৰাশি উলিওৱা।

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

নিৰ্ণায়কৰ দ্বিতীয় সারি এবং দ্বিতীয় স্তম্भ মৌलটির অনুৰাশি

এবং সহৰাশি নিৰ্ণয় কৰো।

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix} \text{ দিহুনলিনি নৈথি লারি আরো নৈথি খাম্ফা গুদিথা বাদিয়ৈ আরো}$$

লোগো লারি দিহুন।

(ii) For the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, show that $A^2 - 5A + 7I = 0$.

Hence find A^{-1} , where I is the identity matrix of order 2. 4

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ মৌলকক্ষৰ বাবে দেখুওৱা যে $A^2 - 5A + 7I = 0$ । ইয়াৰ পৰা A^{-1} উলিওৱা, য'ত I হৈছে 2 ঘাতৰ অভেদ মৌলকক্ষ।

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ মৌলকক্ষৰ ক্ষেত্ৰে দেখাও যে $A^2 - 5A + 7I = 0$ । এর থেকে A^{-1} নির্ণয় কৰো, যেখানে I হল 2 ঘাতের অভেদ মৌলকক্ষ।

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ থোঁসাজায়নি থাম্বায় দিখিদি $A^2 - 5A + 7I = 0$ । বেনিফ্রায় A^{-1} দিহুন, জেৱা I আ জাৱোঁ 2 ফাৱিনি থাৱিথা থোঁসাজায়।

OR / নাইবা / অথবা / এৱা

(b) Solve the linear system : (using matrix method) 6

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ y + 3z &= 11 \\ x - 2y + z &= 0 \end{aligned}$$

ৰৈখিক প্ৰণালীটো সমাধান কৰা : (মৌলকক্ষীয় পদ্ধতিৰে)

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ y + 3z &= 11 \\ x - 2y + z &= 0 \end{aligned}$$

ৰৈখিক প্ৰণালীটি সমাধান কৰো : (মৌলকক্ষীয় পদ্ধতি দ্বাৰা)

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ y + 3z &= 11 \\ x - 2y + z &= 0 \end{aligned}$$

হাঁখোআৰি বিখান্খিখোঁ মাৱফুঁথাই দিহুন : (থোঁসাজায়নি আদৰজোঁ)

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ y + 3z &= 11 \\ x - 2y + z &= 0 \end{aligned}$$

15. Answer (i) and (ii) **or** (a) and (b):

উত্তৰ কৰা (i) আৰু (ii) অথবা (a) আৰু (b):

উত্তৰ দাও (i) এবং (ii) অথবা (a) এবং (b):

ফিননায় লিৰ (i) আরো (ii) এৱা (a) আরো (b):

(i) Find all points of discontinuity of the function f defined by

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{if } x < 1 \\ 0, & \text{if } x = 1 \\ x-2, & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

3

f ফলনৰ বিচ্ছিন্নতাৰ সকলো বিন্দু উলিওৱা য'ত

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{যদি } x < 1 \\ 0, & \text{যদি } x = 1 \\ x-2, & \text{যদি } x > 1 \end{cases}$$

f অপেক্ষকের বিচ্ছিন্নতার সকল বিন্দু নির্ণয় করো যেখানে

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{যদি } x < 1 \\ 0, & \text{যদি } x = 1 \\ x-2, & \text{যদি } x > 1 \end{cases}$$

f মাঝখাননি আন্তর জনায় যাসৈবো বিন্দোত্রৌ দিহুন জেয়াব

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{জুদি } x < 1 \\ 0, & \text{জুদি } x = 1 \\ x-2, & \text{জুদি } x > 1 \end{cases}$$

(ii) If $\cos y = x \cos(a+y)$, with $\cos a \neq \pm 1$, prove that

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}$$

3

যদি $\cos y = x \cos(a+y)$, $\cos a \neq \pm 1$, প্রমাণ করা যে,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}$$

যদি $\cos y = x \cos(a+y)$, $\cos a \neq \pm 1$, প্রমাণ করো যে,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}$$

জুদি $\cos y = x \cos(a+y)$, $\cos a \neq \pm 1$, ফোরমান খালাম দি,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}$$

OR / নাইবা / অথবা / এন্ড

(a) If $y = \sin^{-1} x$, then show that $(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0$. 3

যদি $y = \sin^{-1} x$ হয়, তেত্তে দেখুওরা যে $(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0$ ।

যদি $y = \sin^{-1} x$ হয়, তাহলে দেখাও যে $(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0$ ।

জুদি $y = \sin^{-1} x$ জায়ো, অল্লা দিস্থি দি $(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0$ ।

(b) Given $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{if } x \leq 3 \\ x+4, & \text{if } x > 3 \end{cases}$

If the function f is continuous at $x=3$, find the value of a .

3

দিয়া আছে $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{যদি } x \leq 3 \\ x+4, & \text{যদি } x > 3 \end{cases}$

যদি f ফলনটো $x=3$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হয়, তেত্তে a র মান নির্ণয় করা।

দেওয়া আছে $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{যদি } x \leq 3 \\ x+4, & \text{যদি } x > 3 \end{cases}$

যদি f ফলনটি $x=3$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে a এর মান নির্ণয় করো।

होनाय दं $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{जुदि } x \leq 3 \\ x+4, & \text{जुदि } x > 3 \end{cases}$

जुदि f मावथुनआ $x=3$ बिन्दोआव आन्थोजयि जायो, अब्ला a नि मान दिहनु।

16. Find absolute maximum value and absolute minimum value of the function given by

$$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1, \quad x \in [1, 5]. \quad 6$$

$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ ब द्वाबा निर्दिष्ट f फलनटोब $[1, 5]$ अन्तरालत परम गरिष्ठ आब परम लघिष्ठ मान उलिओरा।

$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ -एर द्वाबा निर्दिष्ट f अपेक्षकटि $[1, 5]$ अन्तराले परम गरिष्ठ एवं परम लघिष्ठ मान निर्णय करो।

$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ नि जोहै थि f मावथुननि $[1, 5]$ आन्थोराव बांसिनथा देरमा आरो हायसिनथा देरमा मान दिहनु।

OR / नाइवा / अथवा / एवा

Find the point(s) on the curve $x^2 = 2y$ which is nearest to the point $(0, 3)$. 6

$(0, 3)$ बिन्दुटोब परा निम्नतम दूरतत $x^2 = 2y$ बक्रटोब ओपबत थका बिन्दु/बिन्दुबोब उलिओरा।

$(0, 3)$ बिन्दुटि थेके निम्नतम दूरतत $x^2 = 2y$ बक्रटि उपरै अवस्थित बिन्दु/बिन्दुगुलि निर्णय करो।

$(0, 3)$ बिन्दोनिफ्राय खाथिसिन जानथाइयाव $x^2 = 2y$ बोहांखोनि सायाव थानाय बिन्दो/बिन्दोफोरखौ दिहनु।

17. Evaluate : (any one)

6

(i) $\int \sqrt{\tan x} \, dx$

(ii) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} \, dx$

मान निर्णय कबा : (यिकोनो एटा)

(i) $\int \sqrt{\tan x} \, dx$

(ii) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} \, dx$

मान निर्णय करो : (ये-कोनो एकटि)

(i) $\int \sqrt{\tan x} \, dx$

(ii) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} \, dx$

मान दिहनु : (जायखिजाया मोनसे)

(i) $\int \sqrt{\tan x} \, dx$

(ii) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} \, dx$

$$(iii) (x - y)dy - (x + y)dx = 0$$

$$(ii) \frac{dy}{y} + \frac{x}{y^2} = x^2$$

$$(i) x(x-1)\frac{dx}{dy} = 1, \quad y(-1) = 0$$

ଉତ୍ତର ଦାବକର ଅନୁକ୍ରମିକ ସମାଧାନ କର : (ଅ-କୋ/୧୩ ମି)

$$(iii) (x - y)dy - (x + y)dx = 0$$

$$(ii) \frac{dy}{y} + \frac{x}{y^2} = x^2$$

$$(i) x(x-1)\frac{dx}{dy} = 1, \quad y(-1) = 0$$

ଉତ୍ତର ଦାବକର ଅନୁକ୍ରମିକ ସମାଧାନ କର : (ସି-କୋ/୧୩ ମି)

$$(iii) (x - y)dy - (x + y)dx = 0$$

$$(ii) \frac{dy}{y} + \frac{x}{y^2} = x^2$$

$$(i) x(x-1)\frac{dx}{dy} = 1, \quad y(-1) = 0$$

18. Solve the following differential equations : (any two) 3+3=6

ସମୀକ୍ଷା ଗଢ଼ା, ଉତ୍ତର କି ମାନ ଦିଅ ।

$$\text{ଯଦି } \frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2} \text{ ଶାଖା ୩} \quad \frac{3k}{x-1} = \frac{1}{y-1} = \frac{5}{6-z} \text{ ଶାଖା ୩}$$

ହେଉ, କି-ଏକ ସମ ସମ୍ପର୍କ କର ।

$$\text{ଯଦି } \frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2} \text{ ଶାଖା ୩} \quad \frac{3k}{x-1} = \frac{1}{y-1} = \frac{5}{6-z} \text{ ଶାଖା ୩}$$

କି-ଏକ ସମ ସମ୍ପର୍କ କର ।

$$\text{ଯଦି } \frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2} \text{ ଶାଖା ୩} \quad \frac{3k}{x-1} = \frac{1}{y-1} = \frac{5}{6-z} \text{ ଶାଖା ୩}$$

are perpendicular, find the value of k.

$$\frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2} \text{ and } \frac{3k}{x-1} = \frac{1}{y-1} = \frac{5}{6-z}$$

(a) (i) If the lines

ନିମ୍ନଲିଖିତ (a) ଓ (b) :

ଉତ୍ତର ଦାବ (a) ଓ (b) :

ଉତ୍ତର ଦାବ (a) ଓ (b) :

19. Answer (a) or (b) :

$$(iii) (x - y)dy - (x + y)dx = 0$$

$$(ii) \frac{dy}{y} + \frac{x}{y^2} = x^2$$

$$(i) x(x-1)\frac{dx}{dy} = 1, \quad y(-1) = 0$$

ମାଧ୍ୟମିକ ସମୀକ୍ଷା ସମାଧାନ କର : (କା-କୋ/୧୩ ମି)

- (ii) Find the Cartesian equation of the line through the point $(5, 2, -4)$ and which is parallel to the vector $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$.

3

$(5, 2, -4)$ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ ভেক্টৰৰ সমান্তৰাল ৰেখাডালৰ কাৰ্টেজীয় সমীকৰণ উলিওৱা।

$(5, 2, -4)$ বিন্দুৰ মধ্য দিয়ে অতিক্ৰান্ত $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ ভেক্টৰৰ সমান্তৰাল ৰেখাটিৰ কাৰ্টেজীয় সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰো।

$(5, 2, -4)$ বিন্দোনী গেজেরজোঁ থানায় $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ ভেক্টৰনি লিগা হাংখোনি কাৰ্টেজিয় (সমানথালয়াৰি) সমানথাই দিহুন।

OR / নাইবা / অথবা / এবা

- (b) Find the shortest distance between the lines

$$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2} \text{ and } \frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}.$$

6

$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2}$ আৰু $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}$ ৰেখা দুডালৰ মাজৰ ন্যূনতম দূৰত্ব উলিওৱা।

$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2}$ এবং $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}$ রেখা দুটিৰ মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰো।

$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2}$ আরো $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}$ হাংখো দোঁনোঁনি গেজেরনি সুঁসিন জানথাই দিহুন।

20. Solve graphically the following linear programming problems :

Maximize and minimize $Z = 3x + 5y$

subject to the constraints

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

6

$Z = 3x + 5y$ ৰ সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন মান উলিওৱা

য'ত

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

$Z = 3x + 5y$ -এৰ সৰ্বোচ্চ এবং সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ণয় কৰো

যেখানে

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

$Z = 3x + 5y$ নি বাঁসিনথা আরো হায়াসিনথা মান দিহুন

জেরাব

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

OR / নাইবা / অথবা / एबा

Determine graphically the minimum value of the
objective function $Z = 3x + 9y$
subject to the constraints

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

6

উদ্দিষ্ট ফলন

$Z = 3x + 9y$ ৰ সৰ্বনিম্ন মান উলিওৱা, য'ত x আৰু y ৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ হ'ল

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

উদ্দিষ্ট অপেক্ষক

$Z = 3x + 9y$ -এৰ সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ণয় কৰো, যেখানে x এবং y -এৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ
হ'ল

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

थांखिथा मावथुन

$Z = 3x + 9y$ नि हायसिनथा मान दिहुन, जेराव x आरो y 'नि हेँथायफोरा जाबाय —

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

×